

Votre guide sur **LUMIGAN RC**[®]



LUMIGAN RC^{MD}
(solution ophtalmique de bimatoprost) 0,01%™



Pourquoi mon médecin m'a-t-il prescrit LUMIGAN RC?

Les gouttes pour les yeux LUMIGAN RC sont utilisées pour diminuer la pression intraoculaire (pression à l'intérieur de l'œil) qui est élevée chez les adultes atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension (haute pression) oculaire. Si cette pression trop élevée n'est pas réduite, votre vision pourrait finir par se détériorer.

Comment LUMIGAN RC agit-il?

LUMIGAN RC appartient à un groupe de médicaments appelés analogues des prostamides. Votre œil contient un liquide transparent composé principalement d'eau qui nourrit l'intérieur de l'œil. Ce liquide est constamment éliminé et renouvelé. Si l'écoulement du liquide n'est pas assez rapide, la pression à l'intérieur de l'œil augmente.

LUMIGAN RC agit en augmentant l'écoulement du liquide, ce qui permet de diminuer la pression à l'intérieur de l'œil.

Modification de la vision

L'utilisation de LUMIGAN RC pourrait temporairement brouiller votre vision. Abstenez-vous de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines jusqu'à ce que votre vision redevienne claire.

Informez votre médecin de tous les médicaments et produits de santé que vous prenez, y compris : médicaments d'ordonnance et en vente libre, vitamines, minéraux, suppléments naturels et produits de médecine douce.

Effets secondaires associés à LUMIGAN RC

LUMIGAN RC peut occasionner des effets secondaires chez certaines personnes. Si vous présentez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessous, communiquez avec votre médecin.

Les effets secondaires de LUMIGAN RC pourraient comprendre les suivants :

- Assombrissement de la paupière
- Irritation de l'œil, rougeur, démangeaisons
- Croissance excessive des poils
- Modification de la longueur (allongement) ou de la couleur des cils
- Rougeur et (ou) démangeaisons de la paupière
- Apparition de petites fissures à la surface de l'œil
- Creusement du sillon de la paupière (œil d'apparence creuse) et affaissement de la paupière

Certaines personnes présentent un changement de la couleur de l'iris, habituellement pendant la première année de traitement. L'assombrissement de la couleur de l'iris peut augmenter tant que LUMIGAN RC est utilisé. On ignore la signification de ce changement à long terme. Consultez votre médecin si vous notez un changement de la couleur de votre iris.



Si vous présentez des effets secondaires associés à l'utilisation de votre médicament, notez-les pour en parler avec votre médecin à votre prochain rendez-vous.

Que dois-je savoir avant de commencer à utiliser LUMIGAN RC?

Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser LUMIGAN RC, afin d'aider à éviter les effets secondaires et d'assurer la bonne utilisation du médicament. Informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes et états de santé, notamment :

- si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments. L'utilisation de LUMIGAN RC avec d'autres médicaments ou produits contre le glaucome peut réduire leur efficacité;
- si vous êtes enceinte ou envisagez de le devenir, ou si vous allaitez ou envisagez d'allaiter. Demandez à votre médecin comment nourrir votre bébé pendant que vous utilisez LUMIGAN RC;
- si vous avez une infection évolutive de l'œil, une inflammation de l'œil (p. ex. une uvéite) ou toute autre affection de l'œil ou de la paupière;
- si vous présentez un autre trouble de l'œil (blessure ou infection);
- si vous avez une sécheresse des yeux importante;
- si vous devez subir une chirurgie de l'œil;
- si vous avez des problèmes de foie ou de reins.

Modification de la couleur de l'œil et de la paupière

LUMIGAN RC a été associé à une coloration plus foncée de l'iris (modification de la partie colorée de l'œil). Cette modification est susceptible d'être permanente et risque d'être plus visible si vous ne traitez qu'un œil. Une utilisation excessive de LUMIGAN RC (surdose) pourrait entraîner ce changement. L'emploi de LUMIGAN RC pourrait aussi causer un assombrissement de la paupière qui peut être réversible chez la plupart des patients.

Croissance de poils

Il est possible que des poils poussent dans des régions de la peau fréquemment en contact avec LUMIGAN RC. Utilisez un papier mouchoir pour essuyer vos yeux après l'administration du produit afin de réduire ce risque. Il est également possible que des changements surviennent dans la longueur, l'épaisseur, la densité, la couleur et le sens de croissance des cils ou dans leur nombre. Ces changements disparaissent habituellement si vous cessez d'utiliser LUMIGAN RC.

Conseils pour vous préparer en vue de votre prochain rendez-vous



- Si vous avez des questions sur votre routine de soins des yeux, y compris sur les médicaments que vous prenez, notez-les avant de rencontrer votre médecin.



- Prenez des notes durant la consultation avec votre médecin afin de vous rappeler plus tard ce dont vous avez discuté.



Quelle est la dose habituelle de LUMIGAN RC?



Utilisez-le 1 fois par jour, le soir

Si vous oubliez votre dose un soir, appliquez 1 goutte dès que vous constatez votre omission, puis reprenez l'administration à l'heure habituelle. N'administrez pas 2 doses.



Administrez 1 goutte dans chaque œil à traiter

N'oubliez pas de retirer vos verres de contact avant l'administration du médicament.



Attendez au moins 5 minutes avant d'administrer d'autres gouttes pour les yeux

Si vous utilisez plusieurs médicaments, assurez-vous de savoir quand et comment les administrer.

N'oubliez pas d'utiliser LUMIGAN RC 1 fois par jour, tous les jours.

Votre médecin surveillera régulièrement votre état.



Utilisez toujours LUMIGAN RC en suivant les directives de votre professionnel de la santé. N'utilisez pas LUMIGAN RC si le sceau de sécurité du goulot a été brisé avant sa première utilisation. LUMIGAN RC contient du chlorure de benzalkonium, un agent de conservation, qui peut modifier la couleur des verres de contact souples. Enlevez vos verres de contact avant d'utiliser ce produit et attendez 15 minutes avant de les remettre.

Comment utiliser LUMIGAN RC?



ÉTAPE 1

Lavez-vous les mains. Inclinez la tête vers l'arrière et fixez le plafond.




ÉTAPE 2

Tirez doucement la paupière inférieure pour former une petite poche.



ÉTAPE 3

Retournez le flacon et pressez-le délicatement pour libérer une goutte dans la petite poche formée par la paupière. Si la goutte tombe à côté de l'œil, recommencez.



ÉTAPE 4

Relâchez la paupière et fermez l'œil pendant 30 secondes.

Répétez les étapes 1 à 4 dans l'autre œil si les 2 yeux doivent être traités.

Pour aider à prévenir les infections, évitez que l'embout du flacon compte-gouttes ne touche votre œil ou autre chose. Fermez le flacon à l'aide du capuchon dès que vous avez terminé.



Pour de plus amples
renseignements à propos de
LUMIGAN RC, consultez votre
professionnel de la santé.

Pour des renseignements complets sur le produit,
consultez le feuillet Renseignements destinés aux
patients fourni avec le médicament.

LUMIGAN RC^{MD}
(solution ophtalmique de bimatoprost) 0,01 %



abbvie

LUMIGAN RC et son identité graphique sont des
marques de commerce de Corporation AbbVie.
© 2023 AbbVie. Tous droits réservés.
1-888-704-8271
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
CA-LUM-220025F / JA 2023



MEMBRE DE
MÉDICAMENTS
NOVATEURS
CANADA

